

# Testsats Borrelia

Innehåller totalt 5 ampuller med information från olika delar av Borreliafamiljen:

- BL01 – B. burgdorferi
- BL02 – B. garinii
- BL03 – B. afzelii
- BL04 – B. valaisianna
- BL05 – B. japonica

Ampuller testas med program 191 eller 197. Behandla med 191, 197 alternativt andra program för behandling av belastningar. Med program 191 och 197 bör tid och förstärkning testas och ställas in. Det betyder att du kan använda dessa ampuller tillsammans (i kombination) med andra ampuller ifall de testas resonans tillsammans.

## Behandling, tillvägagångssätt

### 1. Basterapi.

- Patienten är ansluten till bicom-enhetens ingång och utgång.
- Ingångskoppen innehåller också sekret eller utsöndringar av patienten.

### 2. Uppföljningsprogram (ta bort terapiblockeringar, öppna elimineringsorgan, meridianrelaterade och / eller indikationsrelaterade uppföljningsprogram).

- Patienten är ansluten till bicom-enhetens ingång och utgång.
- Ingångskoppen innehåller också sekret eller utsöndringar av patienten.

### 3. Patogen belastning.

- Patienten är endast ansluten till bicom-enhetens utgång.
- De testade ampull(er) av patogen belastning finns i ingångskoppen.
- De behandlas med ett Ai-program.
- Testa alltid förstärkning och tid! Om behandling sker i kombination med andra belastningsampuller lägg till detta steg. I denna testsats finns inga specifika stabiliseringsampuller.

### 4. Stabilisering.

- Patienten är endast ansluten till bicom-enhetens utgång.
- I ingångskoppen finns den testade rosa stabiliseringsampullen.
- De behandlas med ett A-program. Testa alltid förstärkning och tid!

### 5. Harmonisering.

- Patienten är endast ansluten till bicom-enhetens utgång.
- I ingångskoppen finns de testade stabiliserande ampullerna i testsatsen 5 Element och funktionella kretsar: Prioritetslementampull, meridianampull (er), rosa markerade harmoniserande ampuller (A-program 192 eller 198).
- Därefter utförs terapi (vid behov) med en dämpningsampull (A-program 192 eller 198).
- Testa alltid förstärkning och tid!

Det rekommenderas att även använda BICOM-mineral eller BICOM-olja i den röda utgångskoppen under behandlingen, som patienten intar 2 till 3 gånger om dagen. Alternativt kan du lagra behandlingsinformationen på ett BICOM-chip.